

ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Δ. Βώρος






Aphorisms & Quotations for the Surgeon





"He who wishes to be a surgeon should
go to war." Hippocrates

Edited by Moshe Schein


*Every operation
in surgery is an
experiment in
bacteriology.*








AVERAGE NUMBER OF CULTURABLE ORGANISMS ISOLATED FROM THE FINGER TIPS OF 50 SUBJECTS





ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ή ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

(Επιτολής και εν τω βάθει)








Figure 1. Concentrations of endogenous gastrointestinal anaerobic microflora are shown. Aerobic and anaerobic microorganisms enter the stomach through the esophagus & the pylorus.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Συστηματικοί Παράγοντες

- Διαβήτης
- Παχυσαρκία
- Καρδ. Ανεπάρκεια
- Κάπνισμα
- Κυτταροστατικά
- Ακτινοθεραπεία
- Κορτιζόνη
- Ανασοκαταστολή
- Προεγχειρητικός χρόνος νοσηλείας

Τοπικοί Παράγοντες

- Περιβάλλον χειρουργείου
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος- ασθενούς
- Αντισηψία δέρματος
- Ξύρισμα στο θάλαμο
- Κατάχρηση αντιβιοτικών
- Τεχνική
- Χρήση πλέγματος σε δυνητικά μολυσμένο πεδίο



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

1. Σωστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας, ασηψίας και αντισηψίας.
2. Καλή χειρουργική τεχνική.
3. Προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών, όπου χρειάζεται, σύμφωνα με τους κανόνες.

Η ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Περιεγχειρητική Χορήγηση
1-2 Δόσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Καθαρές : Μαστεκτομή
- Καθαρές με ξένο σώμα : - Πλέγματα
- Ορθοπαιδική πρόθεση
- Βαλβίδες καρδιάς
- Αγγειακά μοσχεύματα
- Καθαρές με Επιμόλυνση: Εντερεκτομή
- Μολυσμένες : Τραύματα εντέρου
- Ρυπαρές : Περιτονίτιδα

ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- Θυρεοειδής
- Μαστός
- Κήλες
- Όγκοι μαλακών μορίων
- Κιρσοί κάτω άκρων

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- Ανθεκτικοί Σταφυλόκοκκοι
- Ανάδυση Εντεροκόκκου (VRE)
- Μύκητες ;

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

- Διασωλήνωση Τραχείας
- Τραχειοστομία
- Καθετήρας Ουρήθρας
- Παροχέτευση Θώρακα
- Καθετήρες Κεντρικών Φλεβών

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιατρικού – Νοσηλευτικού - Βοηθητικού

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β

- Αναγκαίο το εμβόλιο
- Σε περίπτωση αποστήματος πρόσθετη παθητική ανοσία

AIDS

Πιθανότητα μετάδοσης από φορέα

0,5%

(1: 200)



